

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

外皮消毒剤

指定医薬部外品

# ポピボール

10%ポビドンヨード液 含浸綿球

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が広範囲の人。
- (3) 深い傷やひどいやけどの人。



### ■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

### 【効能効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

### 【用法用量】

1日数回患部に塗布する。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (5) 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い流してから使用すること。

### 【成分】

#14 綿球	綿球 1球あたり 10w/v%ポビドンヨード液 2mL 含浸
#20 綿球	綿球 1球あたり 10w/v%ポビドンヨード液 4mL 含浸

添加物として、ラウロマクロゴール、リン酸水素ナトリウム水和物、クエン酸水和物を含む。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 開封後は速やかに使用すること。
- (5) 綿球等を足して使用しないこと。
- (6) 開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。  
綿球は清潔なピンセットなどを用いて使用し、綿球に指が触れないように注意すること。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (8) 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流すこと。

### 【包装】

120包入

### 【消費者相談窓口】

株式会社アグリス お客様相談室 電話番号:0943-30-1100 受付時間:8:30~17:30(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **株式会社アグリス**  
〒834-0055 福岡県八女市鶯池 477-1